



Bovinos

Dectiver® TF

Suspensión Oral de Ivermectina y Triclabendazol

REG. SAGARPA Q- 2083-170

FORMULA

Cada mL contiene:

Ivermectina	2 mg
Triclabendazol	120 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

INDICACIONES:

Desparasitante de amplio espectro, cuyos ingredientes activos triclabendazole e ivermectina están indicados para el control de *Fasciola hepatica* tanto en las fases juveniles como las adultas como para el control de infecciones de parásitos gastrointestinales y pulmonares como *Ostertagia*, *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Oesophagostomum*, *Trichuris*, *Strongyloides*, *Nematodirus*, *Chabertia*, *Dyctiocaulus*, *Oestrus* (etapa larval). piojos chupadores.

USO EN:

Ganado bovino, ovinos y caprinos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos: 5 mL por cada 50 kg de peso vivo.

Ovinos y caprinos: 0.5 mL por cada 5 kg de peso vivo.

ADVERTENCIAS

No debe usarse éste producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

Sacrificar los animales para consumo humano después de 21 días del último tratamiento. Cuando la leche o sub-productos de la leche sean para el consumo humano, no se deberá administrar a vacas 28 días antes del parto o durante la lactancia.

Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la Ivermectina por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deberán ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos.



Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase en un lugar fresco y no se exponga a los rayos de sol.

Agite bien antes de usarse.

PRESENTACIONES

Frascos de plástico de 1 litro y garrafas de 5 litros.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

