



Porcinos

Diramox® L.A.

Amoxicilina inyectable de Larga Acción

REG. SAGARPA Q-2083-085

FORMULA

Cada ml. contiene:

Amoxicilina (como trihidrato)	150 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

INDICACIONES:

Diramox® L.A. esta indicado en el tratamiento de las infecciones causadas por una gran variedad de bacterias Gram negativas y Gram positivas que afectan las vías respiratorias, tracto digestivo, piel, tracto urogenital en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y gatos.

DESCRIPCION:

Antibiótico semisintético de amplio espectro, análogo de la Ampicilina perteneciente al grupo de los beta lactámicos.

MECANISMO DE ACCION:

La Amoxicilina es absorbida rápidamente después de haber sido inyectada. Se difunde en la mayoría de los tejidos y fluidos orgánicos. Los beta lactámicos son antibióticos con efecto bactericida que destruyen la pared de las células bacterianas debido a que se unen a una variedad de proteínas responsables de la síntesis de dicha pared. La interferencia con tales proteínas resulta en muerte y lisis de las bacterias.

La Amoxicilina, posee algunas ventajas que la hacen diferente a otras penicilinas:

Actividad contra gérmenes gram-negativos como *E. coli*, *Salmonella spp* y *Proteus spp*.

Actividad contra *Pseudomona aeruginosa*.



ESPECTRO DE ACCIÓN:

Gram negativos

Pasteurella spp.
Brucella spp.
Fusobacterium spp.
Haemophilus spp.
Fusiformis spp.
Salmonella spp.
Moraxella spp.
Bordetella spp.
Escherichia coli
Proteus spp.
Klebsiella pneumoniae

Gram positivos

Bacillus anthracis
Erysipelothrix spp.
Staphylococcus aureus
Clostridium spp.
Streptococcus suis
Corynebacterium spp.

DOSIS

Para todas las especies 15 mg/kg de peso (1 mL por cada 10 kg).

Si es necesario se puede repetir la dosis a las 48 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: Intramuscular profunda.

Perros y gatos: Subcutánea o intramuscular profunda.





Porcinos

ADVERTENCIAS

No se administre en animales con antecedentes alérgicos a la penicilina.

No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 21 días posteriores al tratamiento.

Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

La leche de los animales tratados no deberá consumirse en las primeras 72 horas después de a última aplicación.

Almacenar en un lugar fresco, protéjase de la luz solar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Frascos de 100 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

