

Lapisa®
SALUD ANIMAL



Lapicef®
REGISTRO ICA No. 10059-MV

POR UNA MEJOR CALIDAD
DE LECHE

www.lapisa.com



Lapicef®

Suspensión intramamaria
REGISTRO ICA No. 10059-MV

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada jeringa con 10 mL contiene:

Cefapirina **300 mg**
(Equivalente a 385 mg de Cefapirina Benzatínica)
Excipientes c.s.p

DESCRIPCIÓN

Lapicef® contiene como ingrediente activo cefapirina benzatínica (un derivado biosintético del ácido 7-aminocefalosporánico) el cual posee un amplio espectro de actividad bactericida contra organismos grampositivos y gramnegativos, para la prevención y el tratamiento de mastitis en vacas secas.

MECANISMO DE ACCIÓN

Lapicef® posee una actividad bactericida prolongada, protegiendo las dos etapas en donde las vacas son más susceptibles a contraer mastitis: el período seco temprano y próximo al parto.

La cefapirina tiene una acción bactericida contra *Streptococcus agalactiae* y *Staphylococcus aureus*, incluyendo cepas resistentes a la penicilina.

Para determinar en laboratorio la susceptibilidad bacteriana a este antibiótico usualmente se utilizan discos de cefalotina (30 mcg), método Kirby-Bauer.



INDICACIONES

Tratamiento de la mastitis durante el periodo seco producidas por *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus agalactiae*, incluyendo cepas resistentes a las penicilinas.

DOSIS

Aplicar el contenido de una jeringa en cada cuarto al final del último ordeño del periodo de lactación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramamaria.

MODO DE EMPLEO

Al momento del secado, ordeñar por completo los cuatro cuartos siguiendo una rutina higiénica. Desinfectar la punta del pezón y el con las toallas de algodón con solución de alcohol al 70%, empleando una distinta para cada pezón. Dejar secar.

Utilizar la técnica de inserción parcial removiendo el tapón rojo protector para dejar expuestos de 3 a 4 mm de la punta de la jeringa.

Insertar la punta de la jeringa en el ducto del pezón y administrar por completo el contenido de **Lapicef®** dentro del cuarto. Retirar la jeringa y masajear suavemente el cuarto para distribuir el medicamento y aplicar un sellador de barrera.

ADVERTENCIAS

Uso exclusivo en vacas secas.

Almacenar en un lugar fresco y seco en temperatura ambiente de 15-30 °C, protegido de la luz del sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No administrar junto con otros antibióticos bacteriostáticos.

TIEMPO DE RETIRO

* Las vacas tratadas no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 42 días después de finalizado el tratamiento.

* La leche de las vacas tratadas no debe utilizarse para consumo humano durante las primeras 120 horas después del parto.

* No usar dentro de los 30 días previos al parto.

PRESENTACIONES

Caja con 12 jeringas de 10 mL.

País de origen: **México.**

Maquilador: **Lapisa SA de CV**

Importador: **Anasac Colombia Ltda**

Período de validez: **36 meses.**

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO