

# Coxizuril 5%

SUSPENSIÓN ORAL

REG. ICA. 10039-MV

USO VETERINARIO

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada mL contiene:

Toltrazuril	50 mg
Excipiente c.s.p.	1 mL

## INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento y la prevención de la coccidiosis en perros y gatos. En lechones neonatos y corderos para el tratamiento y control de coccidiosis causada por: en lechones: *Isospora suis*; en corderos, *Eimeria crandallis* y *Eimeria ovinoidalis*.

## MODO DE ACCIÓN:

El toltrazuril induce cambios durante la etapa del desarrollo intracelular de los protozoarios, debido principalmente a la vacuolización del retículo endoplasmático, disminuyendo la división nuclear.

Coxizuril 5% actúa contra todas las etapas del desarrollo de protozoarios, interfiere la división del núcleo del protozoario, afecta la actividad de las mitocondrias y daña a los corpúsculos que forman la pared en los microgametos.

## ESPECIES:

Porcinos, ovinos, perros y gatos.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

### Administración oral.

La dosis recomendada de toltrazuril en porcinos, ovinos, perros y gatos es de 20 mg/kg de peso vivo, que corresponde a 1 mL de Coxizuril 5% por cada 2.5 kg de peso vivo.

Lechones de 3 a 6 días de edad.

## ADVERTENCIAS:

Agítese bien antes de usarse.

Se recomienda utilizar un sistema de administración con una exactitud de dosificación de 0.1 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz del sol.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.



## TIEMPO DE RETIRO:

**Los porcinos tratados no deben de sacrificarse para el consumo humano hasta 73 días de finalizado el tratamiento.**

**Los ovinos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 77 días después de finalizado el tratamiento.**

**No administrar a ovejas en producción de leche para consumo humano.**

## PRESENTACIONES:

Botella de 250 mL.