

FICHA TECNICA

BOTRIMIL

TIPO	Fungicida de origen vegetal
INGREDIENTE ACTIVO	Carvacrol + Timol + Citral
GRUPO QUIMICO	Extracto vegetal
CONCENTRACION Y FORMULACION	90% SL (Concentrado Soluble)
MODO DE ACCION	Contacto, preventivo
TOXICIDAD	Grupo IV Ligeramente toxico LD50 producto comercial: * Oral : No produjo efecto adverso observable (NOEL) a la dosis de 5.000 mg/kg de peso vivo en ratas. * Dermal: No produjo efecto adverso observable (NOEL) a la dosis de 5.000 mg/kg de peso vivo en ratas. Etiqueta con franja de color VERDE Palabra : PRECAUCIÓN
ANTIDOTO	No existe antídoto específico.
No REGISTRO DE VENTA ICA	Registro de venta ICA No. 9578

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Problema	Dosis		Observaciones
		al suelo	al follaje	
Flores	Botritis (<i>Botrytis sp</i>) y mildew polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>).		7 c.c./litro de agua	7 c.c. por litro de agua cada cuatro (4) días, bajo condiciones de alta severidad y de un clima favorable para el patógeno. Como preventivo 4 c.c. Por litro de agua, en el programa de rotación.
Hortalizas, Ornamentales, Frutales, Algodón	Botritis (<i>Botrytis sp</i>) y mildew polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>).	2 Lts/ha, 200cc/20Lts de agua ó 2Lts/Caneca de 55 gal	1 Lts/ha, 100cc/20Lts de agua ó 1Lts/Caneca de 55 gal	Se recomienda realizar las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o en las ultimas de la tarde. La dosis recomendada es preventiva cada 15 días y en aparición de los síntomas o para control se recomienda tres aplicaciones con frecuencia semanal con 10 c.c. por litro de agua (2 lts/caneca 200 lts).

PRINCIPALES CARACTERISTICAS	BOTRIMIL [®] es un fungicida botánico de amplio espectro obtenido a partir de extractos vegetales homogenizados en una base oleosa orgánica que mezcla fácilmente con el agua, es completamente orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente, desarrollado para proteger de algunas enfermedades a flores, frutales, hortalizas, algodón y plantas ornamentales. Actúa como endoelicitador y exoelicitador por los metabolitos presentes en los extractos. Además algunos alteran el hábitat de los hongos.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Hacer la preparación directamente en el tanque de la aspersiona colocando primero la mitad del agua recomendada, luego la dosis de BOTRIMIL AGRISAN [®] y posteriormente, agregar agua hasta completar el volumen de la mezcla.
COMPATIBILIDAD	BOTRIMIL [®] es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin embargo en caso de duda se recomienda hacer una premezcla para observar compatibilidad física.
FITOTOXICIDAD	BOTRIMIL no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.
PERIODOS DE CARENCIAS	No hay restricción.
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	No hay restricción.
TOLERANCIAS	No hay restricción.
PRESENTACION	1, 4 y 20 litros

Leer la etiqueta antes de usar este producto.

ES UN PRODUCTO CIENTO POR CIENTO ECOLÓGICO Y MUY ÚTIL PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS.